

"مقاله پژوهشی"

تأثیر آتش‌سوزی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: مراتع ورچشمه توسمال مازندران)

سودابه یدالله‌نژاد^۱، زینب جعفریان^۲، قدرت‌الله حیدری^۳ و رضا تمرتاش^۴

- ۱- دانش‌آموخته ارشد علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 - ۲- استاد گروه علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، (نویسنده مسوول: z.jafarian@sanru.ac.ir)
 - ۳- دانشیار گروه علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 - ۴- دانشیار گروه علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
صفحه: ۱۲ تا ۲۳

چکیده

آتش‌سوزی از مهم‌ترین عوامل بوم‌شناختی است که می‌تواند عملکرد بوم‌سامانه طبیعی را تغییر دهد. رویش گیاهان به خاک وابسته است و آتش‌سوزی می‌تواند تغییرات مختلفی را در آن ایجاد کند. در این پژوهش، به‌منظور بررسی اثر آتش‌سوزی بر خاک و پوشش گیاهی، دو مرتع آتش‌سوزی شده و شاهد (هرکدام به مساحت ۳۷ هکتار) با در مراتع ورچشمه توسمال کیاسر استان مازندران انتخاب شد و در هر رویشگاه نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک به‌روش منظم-تصادفی انجام شد. در هر دو رویشگاه ۱۰ پروفیل حفر و نمونه‌برداری از عمق ۰-۱۵+ و ۳۰-۱۵ سانتی‌متری انجام شد. جهت برداشت داده‌های پوشش گیاهی از ۳۰ پلات مربعی شکل یک متر مربع استفاده گردید. خصوصیات گیاهی شامل فرم حیاتی، تنوع زیستی و خصوصیات خاک شامل رطوبت، بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربن آلی، آهک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم تعیین شد. نتایج حاصل از فرم‌های زیستی در مراتع شاهد و آتش‌سوزی شده نشان داد که بر اثر آتش‌سوزی گونه‌های چندساله مناطق آتش‌سوزی شده در مقایسه با شاهد به میزان ۳۳/۱۵ درصد کاهش یافتند. درحالی‌که اثر معنی‌داری بر گونه‌های یک‌ساله و دوساله نداشت. نتایج حاصل از اثر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌های کل نشان داد که شاخص‌های تعداد گونه، تنوع سیمپسون، شانون، غنای مارگالف و منهنیک به‌ترتیب یک‌نواختی بود. نتایج حاصل از آزمایشات خاک نشان داد که درصد شن و سیلت، پتاسیم قابل جذب خاک، فسفر قابل جذب، نیتروژن خاک، آهک، کربن، ماده آلی، اسیدیته خاک و هدایت الکتریکی در تیمار آتش‌سوزی شده به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. اما درصد رس و درصد رطوبت خاک در مناطق سوخته شده در مقایسه با شاهد روند کاهشی را نشان داد.

واژه‌های کلیدی: آتش‌سوزی، تجزیه کاهشی، تنوع گونه‌ای، مراتع

مقدمه

(۴۷). از طرف دیگر، آتش به‌عنوان یکی از فرآیندهای بوم‌شناختی (به‌همراه اقلیم و چرای دام) و یک نیروی (پدید) طبیعی، قابل تکرار بوده و می‌تواند نقش مهمی را در پایداری، شکل و بقای بوم‌سامانه‌ها به‌ویژه علفزارها ایفاء کند و می‌تواند یک مکانیسم‌های اولیه برای حفظ تولید، ساختار، تنوع، جمعیت، پویایی عملکرد و قدرت رویشی گراسلندها باشد و تکامل بسیاری از گونه‌های گیاهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۳۳). همچنین، آتش‌سوزی با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه و نوع پوشش گیاهی اثرات متفاوتی بر مراتع دارد از جمله آن‌ها می‌توان به حذف گیاهان چوبی نامرغوب، افزایش تولید و خوشخوراکی علوفه، آزاد کردن مواد مغذی گیاه و لاشبرگ در خاک، آماده کردن بستر برای بذركاری، کنترل آفات و بیماری‌های قارچی اشاره کرد (۵). آتش‌سوزی همچنین می‌تواند گیاهان چوبی، خشبی و بوته‌ای را به‌طور معنی‌داری کاهش دهد و زمینه مساعدی را برای رشد و افزایش گیاهان علفی مخصوصاً یکساله‌ها و گسترش گیاهان اشکوب تحتانی فراهم کند. در پژوهشی لمبو و همکاران (۲۸) بیان داشتند که آتش‌سوزی تأثیر مستقیمی بر ترکیب و تراکم پوشش گیاهی دارد. بعد از وقوع آتش‌سوزی تغییرات فیزیولوژیکی در پوشش گیاهی رخ می‌دهد و مراحل رشد درختان را با اختلال مواجه می‌سازد. همچنین گارسیا و همکاران (۱۸) به بررسی تأثیر قطع درختان بر خواص خاک و

خاک یکی از عوامل مؤثر در تعادل و پایداری بوم‌سامانه طبیعی است و یکی از منابع اصلی تجدیدناپذیر در جهان به‌شمار می‌رود. تخریب خاک تهدیدی اصلی در سراسر کره‌ی زمین است (۳۷) زیرا از آن به‌عنوان یک پشتیبان ضروری برای سیستم‌های طبیعی و اجتماعی - بوم‌شناختی استفاده می‌شود (۴۲). یکی از متداول‌ترین آشفته‌گی‌های بالقوه و درعین‌حال ویرانگر، آتش‌سوزی است (۳۴). آتش‌سوزی زمانی رخ می‌دهد که مواد اشتعال‌پذیر همچون پوشش گیاهی، گرما و اکسیژن به‌مقدار کافی وجود داشته باشد (۲۳). آتش‌سوزی از مهم‌ترین عوامل بوم‌شناختی است که می‌تواند عملکرد بوم‌سامانه‌های طبیعی را تغییر دهد (۴۶) رویش گیاهان به خاک وابسته است و آتش‌سوزی می‌تواند تغییرات مختلفی را در آن ایجاد کند (۲۸،۳۶) این تغییرات دامنه وسیعی از ویژگی‌های کانی‌شناختی، فیزیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و بیولوژیکی را در برمی‌گیرد که بسته به رژیم آتش‌سوزی می‌تواند متفاوت باشد. تغییرات به‌وجود آمده توسط آتش‌سوزی در محیط خاک روی چرخه عناصر غذایی، تنوع زیستی، موجودات خاکزی، آب‌سویی و فرسایش تأثیر می‌گذارد (۱۸،۲۹). شایان ذکر است که علت بسیاری از آتش‌سوزی‌ها نتیجه فعالیت‌های انسانی بوده و این‌درحالی است که تنها، بخش کوچکی از آن به‌وسیله عوامل محیطی به‌وجود می‌آیند

هرچه بهتر مراتع ضرورت بررسی آنرا بیشتر می‌نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات چندساله آتش‌سوزی بر برخی عوامل خاک و پوشش گیاهی در منطقه مرتعی ورچشمه توسمال کیاسر در نظر دارد با بررسی مقایسه اثرات آتش‌سوزی بر روی خاک و پوشش گیاهی در دو رویشگاه آتش‌سوزی شده و عدم آتش‌سوزی در جهت استمرار استفاده از مراتع و مدیریت آبی این منطقه، گام مهم و مؤثری بردارد.


مواد و روش‌ها

معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحت ۳۷ هکتار در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان ساری در دامنه جنوبی کوه‌های البرز با مختصات "۵۰' ۳۵" تا "۵۵' ۳۵" عرض جغرافیایی و "۵۵' ۵۰" تا "۵۱' ۵۰" طول جغرافیایی واقع شده است. ارتفاع محل از سطح دریا ۲۱۵۶ متر و شیب عمومی بیش از ۳۰ درصد با جهت جنوبی است. متوسط بارندگی سالیانه در ارتفاعات بالای ۲۳۰ میلی‌متر و در ارتفاعات پایین دست ۳۵۰ میلی‌متر، بیشینه دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه درجه حرارت دو درجه سانتی‌گراد می‌باشد (۳۹).

بهبود پوشش گیاهی تحت‌تأثیر آتش‌سوزی در پارک سیریا دماربو اسپانیا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با مقایسه بین پلات شاهد و پلات آتش‌سوزی، تفاوت قابل توجهی در تعداد گونه‌های گیاهی ثبت شده مشاهده نشده اما تعداد افراد هر گونه (یکنواختی) به‌طور قابل توجهی در پلات شاهد بالا بود. بادیا و همکاران (۴) در مطالعات خود به بررسی اثرات آتش‌سوزی بر مواد مغذی و کربن آلی در خاک سطحی در شمال شرقی اسپانیا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مقدار کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آمونیوم، نترات و فسفر یک هفته پس از آتش‌سوزی در عمق یک سانتی‌متری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین بلافاصله پس از آتش‌سوزی شدید به‌علت حرارت زیاد، میزان کربن آلی کاهش و مقدار مواد مغذی افزایش یافته است.

با توجه به موارد فوق اهمیت آتش در پایداری درازمدت بسیاری از بوم‌سامانه‌های طبیعی، اخیراً به موضوع جالبی برای محققان تبدیل شده است (۶،۸). از طرفی چون در منطقه مورد مطالعه، تحقیقی در خصوص اثرات آتش‌سوزی بر خصوصیات کیفی خاک و پوشش گیاهی انجام نشده است، همچنین با توجه به اهمیت این موضوع در پایش، شناسایی جنبه‌های مختلف آتش‌سوزی جهت مدیریت و برنامه‌ریزی



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران و کشور ایران
Figure 1. Location of the study area in Mazandaran province and Iran

قطعه نمونه از دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتی‌متری خاک با استفاده از اوگر برداشت و با ترکیب آن‌ها برای هر قطعه، یک نمونه خاک به‌دست خواهد آمد و در کل ۲۰ نمونه خاک جمع‌آوری شد. برای نمونه‌برداری پوشش گیاهی، با توجه به اندازه و فاصله گیاهان در منطقه و لزوم حجم مناسب داده، در هر سایت ۳۰ پلات یک متر مربع در امتداد ۳ متر نواری (ترانسکت) به طول ۴۵۰ متر و فاصله هر ترانسکت ۲۵۰ متر مستقر شد. جهت برداشت داده‌های پوشش علفی از قبیل نوع گونه، فراوانی، فرم رویشی، تراکم (تعداد در واحد سطح)، درصد پوشش، درصد خاک لخت، درصد لاشبرگ، درصد سنگ و سنگ‌ریزه، با توجه به ویژگی‌های رستنی‌های موجود از پلات مربعی شکل ۱×۱ مترمربع استفاده شد.

روش مطالعه

پس از بررسی آمار آتش‌سوزی‌های به‌وقوع پیوسته با استفاده از پرسش از محیط‌بانان و بازدید از پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه (در این مطالعه اثر آتش‌سوزی بر خاک و پوشش گیاهی بعد از گذشت ۷ سال بررسی می‌شود)، دو مرتع آتش‌سوزی شده و شاهد (هرکدام به مساحت ۳۷ هکتار) با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) مورد شناسایی قرار گرفتند. جهت بررسی اثر آتش‌سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی، از روش تصادفی-منظم استفاده شد به این‌صورت که برای نمونه‌های خاک ابتدا ترانسکت‌ها به‌صورت تصادفی مستقر، سپس پنج قطعه نمونه یک متر مربعی به‌صورت منظم در امتداد این مترنواری (ترانسکت) قرار داده شد و از ۱۰ نقطه

منهنيک، يکنواختی) از نرم‌افزار Past استفاده شد (۲۷). همچنين جهت بررسی روابط بين خصوصيات خاک و پوشش گیاهی در تيمارهای شاهد و آتش‌سوزی منطقه، از روش تجزيه چند متغیره در نسخه چهارم نرم‌افزار CANOCO استفاده گردید (۴۳). در روش تجزيه چند متغیره، ابتدا از تجزيه DCA (تجزيه تطبیقی قوس‌گیری شده) که یک روش تجزيه غير مستقیم است، به‌منظور شناسایی همبستگی بين گونه‌ها و نمونه‌ها در فضای دو بعدی (محورها) و تعيين طول گراديان استفاده شد. با توجه به اینکه طول گراديان کمتر از ۰/۱ بود، از تجزيه RDA برای بررسی دقيق‌تر تأثير عوامل محیطی بر روی شاخص‌های موردنظر استفاده شد (۲۷).

نتایج و بحث

بررسی فرم‌های رویشی در مراتع شاهد و آتش‌سوزی نشده

بررسی فرم‌های رویشی در مراتع شاهد و آتش‌سوزی نشده نشان داد که بر اثر آتش‌سوزی، گونه‌های چندساله مناطق آتش‌سوزی شده در مقایسه با شاهد به‌صورت معنی‌دار کاهش یافت. این در حالی است که گونه‌های یکساله در مراتع آتش‌سوزی افزایش یافته است ولی اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (جدول ۱۰).

جهت اندازه‌گیری مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک، نمونه‌های خاک پس از انتقال به آزمایشگاه، هوا خشک شده و از الک ۲ میلی‌متری عبور داده شدند درصد رطوبت به‌روش توزین و خشک کردن، بافت خاک (درصد اجزاء تشکیل‌دهنده خاک)، با روش هیدرومتری، اسیدیته خاک به‌روش پتانسیومتری با استفاده از دستگاه pH متر، هدایت الکتریکی پس از عصاره‌گیری با استفاده از دستگاه مخصوص اندازه‌گیری هدایت الکتریکی (EC متر)، آهک به‌روش کلسیمتری، کربن آلی به‌روش والکی بلاک، نیتروژن کل به‌روش کج‌دال، پتاسیم و کلسیم قابل جذب با محلول استات آمونیوم استخراج و با استفاده از دستگاه جذب اتمی، در آزمایشگاه اندازه‌گیری شدند (۲۴).

تجزیه و تحلیل داده‌ها

در نهایت جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ ابتدا آزمون نرمال بودن داده‌ها صورت پذیرفت که برای این منظور از آزمون‌های آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. در این تحقیق جهت مقایسه خصوصيات پوشش گیاهی و خاک در دو تیمار شاهد و آتش‌سوزی، در دو عمق خاک از آزمون t غیرجفتی و آزمایش فاکتوریل (اثر رویشگاه، اثر عمق خاک) در قالب طرح کاملاً تصادفی در ده تکرار استفاده شد. جهت تعیین شاخص‌های تنوع (تنوع سیمپسون، شانون، غنای مارگالف و

جدول ۱- نتایج حاصل تجزیه واریانس فرم‌های رویشی در مناطق مورد مطالعه

Table 1. Variance analysis results of forms vegetative in the study areas

فرم رویشی	منطقه	میانگین (درصد)	درجه آزادی	t	معنی‌داری
یکساله	شاهد	۰/۰±۸۶/۰۳	۵۸	-۱/۶۷۲	۰/۱ ^{ns}
	آتش	۱/۰±۰۴/۰۵	۵۸		
دو ساله	شاهد	۰/۰±۰۷/۰۲	۵۸	۰/۷۴۸	۰/۴ ^{ns}
	آتش	۰/۰±۰۳/۰۱	۵۸		
چند ساله	شاهد	۱/۰±۸۷/۱	۵۸	۷/۱۸۱	۰/۰۰۱ ^{**}
	آتش	۱/۰±۲۵/۱	۵۸		

*، ** و ns: به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد و عدم معنی‌داری می‌باشد.

معنی‌دار ($p < 0.05$) بين میانگین تیمارها وجود دارد. به‌گونه‌ای که در منطقه آتش‌سوزی درصد پوشش گیاهی در اثر آتش‌سوزی کاهش داشته است (جدول ۲).

بررسی درصد پوشش گیاهی در مراتع شاهد و آتش‌سوزی شده

با توجه به نتایج آماری حاصل از آزمون t غیرجفتی، مقایسه درصد پوشش گیاهی در مرتع شاهد و آتش‌سوزی نشان داد که در منطقه شاهد و آتش‌سوزی شده اختلاف

جدول ۲- نتایج حاصل تجزیه واریانس درصد پوشش در مناطق مورد مطالعه

Table 2. Variance analysis results of coverage percentage in the study areas

منطقه	میانگین	انحراف معیار	درجه آزادی	t	معنی‌داری
شاهد	۸۴/۲۰	۵/۰۳	۵۸	۱۴/۶۳۷	۰/۰۰۱ ^{**}
آتش	۴۰/۱۰	۱۵/۷۲	۵۸		

*، ** معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد می‌باشد.

مارگالف دو شاخصی هستند که نشان دهنده غنای گونه‌ای هستند. شاخص منهنيک و مارگالف در رویشگاه شاهد نسبت به آتش‌سوزی بیشتر بود. نتایج حاصل از تجزیه آزمون t غیرجفتی شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی کل گونه‌ها نشان‌دهنده این مطلب است که شاخص‌های تنوع سیمپسون، شانون، تاکسا، منهنيک و غنای مارگالف دارای اختلاف معنی‌دار ($p < 0.01$)، بودند، به‌طوری‌که در مرتع آتش‌سوزی

بررسی تنوع و غنای گونه‌ای در منطقه شاهد و آتش‌سوزی شده نشان داد که تنوع و غنای گونه در رویشگاه شاهد نسبت به منطقه آتش‌سوزی بیشتر است. همچنین بیشتر بودن شاخص تنوع شانون در منطقه شاهد، بیشتر بودن تنوع را در این منطقه نشان می‌دهد. بر خلاف این موضوع کمتر بودن مقدار عددی شاخص سیمپسون در رویشگاه شاهد نشان‌دهنده تنوع بیشتر در این رویشگاه است. شاخص‌های منهنيک و

شده مقدار تنوع و غنا کاهش پیدا کرده است. در حالی که آتش فاقد اثر معنی‌داری بر تنوع شاخص یکنواختی بوده است
جدول ۳- تجزیه واریانس شاخص‌های تنوع زیستی

Table 3. Results from analysis of variance of biodiversity indicators

معنی‌داری	t	درجه آزادی	میانگین	رویشگاه	شاخص تنوع زیستی
۰/۰۰۱**	۹/۲۲	۵۸	۰/۰±۷۵/۰۴	شاهد	تنوع سیمپسون
		۵۸	۰/۰±۴۱/۰۱	آتش	
۰/۰۰۱**	۱۵/۴۸۵	۵۸	۱/۰±۹۲/۱	شاهد	تنوع شانون
		۵۸	۰/۰±۸۱/۰۲	آتش	
۰/۰۰۱**	۱۸/۴۶۶	۵۸	۳/۰±۰۸/۰۴	شاهد	غنا ی مارگلف
		۵۸	۰/۰±۶۷/۰۴	آتش	
۰/۰۰۱**	۱۲/۰۴	۵۸	۱/۰±۱۴/۰۴	شاهد	غنا ی منهینینگ
		۵۸	۰/۰±۵۸/۰۴	آتش	
۰/۰۶۸ ^{ns}	-۰/۴۱۳	۵۸	۰/۰±۷۰/۰۲	شاهد	یکنواختی
		۵۸	۰/۰±۷۱/۰۲	آتش	
۰/۰۰۱**	۲۱/۲۱	۵۸	۱/۰±۱۰/۰۳	شاهد	تعداد گونه
		۵۸	۳/۰±۳۷/۰۳	آتش	

** و ns: به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد و عدم معنی‌داری می‌باشد.

نتایج مطالعات خاک‌شناسی


خاک نبوده است. در حالی که اثر مستقل رویشگاه، عوامل مربوط به خاک را به‌طور معنی‌داری در سطح ۱ و ۵ درصد تحت تاثیر قرار داده است (جدول ۴).

نتایج تجزیه واریانس به‌روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی نشان داد که اثر مستقل عمق و اثر متقابل رویشگاه و عمق دارای اثر معنی‌داری بر عوامل مربوط به جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس در دو منطقه آتش‌سوزی و شاهد

Table 4. Results of analysis of variance in two areas of fire and control

مقدار p	آماره F	درجه آزادی	منبع تغییرات	عوامل خاکی
۰/۰۰۰**	۵۴/۷۶	۱	رویشگاه	رس (درصد)
۰/۱۱۵ ^{ns}	۲/۶۶	۱	عمق خاک	
۰/۸۲۳ ^{ns}	۰/۰۵۱	۱	رویشگاه × عمق خاک	سیلت (درصد)
۰/۰۰۳*	۶/۴۶۵	۱	رویشگاه	
۰/۶۷۶ ^{ns}	۰/۱۷۹	۱	عمق خاک	شن (درصد)
۰/۵۴۱ ^{ns}	۰/۳۸۴	۱	رویشگاه × عمق خاک	
۰/۳۵۵ ^{ns}	۰/۸۸۴	۱	رویشگاه	رطوبت خاک (درصد)
۰/۷۵۷ ^{ns}	۰/۱۷۹	۱	عمق خاک	
۰/۷۰۰ ^{ns}	۰/۳۸۴	۱	رویشگاه × عمق خاک	هدایت الکتریکی
۰/۰۰۰**	۳۴/۷۲	۱	رویشگاه	
۰/۱۷ ^{ns}	۱/۹۸	۱	عمق خاک	اسیدیته خاک
۰/۸۳۷ ^{ns}	۰/۰۴۳	۱	رویشگاه × عمق خاک	
۰/۰۰۰**	۲۷/۳۴	۱	رویشگاه	آهک
۰/۴۱۷ ^{ns}	۰/۶۸	۱	عمق خاک	
۰/۰۹ ^{ns}	۰/۰۱۶	۱	رویشگاه × عمق خاک	کربن آلی (درصد)
۰/۰۰۳*	۶/۰۳	۱	منطقه	
۰/۳۱ ^{ns}	۱/۰۶۷	۱	عمق خاک	نیترژن کل
۰/۱۸۶ ^{ns}	۰/۰۳۱	۱	منطقه × عمق خاک	
۰/۰۰۰**	۶۹۲/۹۲	۱	رویشگاه	پتاسیم (گرم در کیلوگرم)
۰/۰۸ ^{ns}	۳/۱۸	۱	عمق خاک	
۰/۱۸۹ ^{ns}	۰/۰۲۱	۱	رویشگاه × عمق خاک	فسفر قابل جذب (گرم در کیلوگرم)
۰/۰۰۹*	۷/۹۰۳	۱	منطقه	
۰/۵۷ ^{ns}	۰/۳۲۹	۱	عمق خاک	نیترژن کل
۰/۵۵ ^{ns}	۰/۲۶۸	۱	رویشگاه × عمق خاک	
۰/۰۰۰*	۱۸/۷۶۶	۱	رویشگاه	نیترژن کل
۰/۰۹ ^{ns}	۳/۱۴۷	۱	عمق خاک	
۰/۱۶ ^{ns}	۲/۱۲۶	۱	رویشگاه × عمق خاک	پتاسیم (گرم در کیلوگرم)
۰/۰۰۰**	۴۹/۸۵۳	۱	رویشگاه	
۰/۱۰۶ ^{ns}	۲/۸۰۱	۱	عمق خاک	فسفر قابل جذب (گرم در کیلوگرم)
۰/۴۷۳ ^{ns}	۰/۵۳۳	۱	رویشگاه × عمق خاک	
۰/۰۰۱**	۱۳/۷۳	۱	رویشگاه	فسفر قابل جذب (گرم در کیلوگرم)
۰/۴۱۳ ^{ns}	۰/۶۹۱	۱	عمق خاک	
۰/۶۱ ^{ns}	۰/۲۶۷	۱	رویشگاه × عمق خاک	

**، *، ns: به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد و عدم معنی‌داری می‌باشد.



شکل ۲- مقایسه میانگین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو تیمار آتش و شاهد. حروف غیرمشترک تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد را نشان می‌دهد.

Figur 2. Mean comparison physico-chemical properties of soil in both fire treatments and control treatments, Similar letters are significant at 1% and 5% probability level

هدایت الکتریکی، آهک، نیتروژن، پتاسیم و فسفر بر روی پوشش گیاهی منطقه معنی‌دار است ($F\text{-ratio}=1/764$) و ($P\text{-value}=0/001$). بر اساس دیاگرام دوبعدی حاصل از روش آنالیز کاهشی (RDA) می‌توان بیان کرد که، درصد سیلت با جهت منفی محور اول و مثبت محوردوم، شاخص‌های نیتروژن، پتاسیم، فسفر، آهک، هدایت الکتریکی و درصد کربن آلی و ماده آلی با جهت منفی محور اول و دوم و درصد رس با جهت مثبت محور اول و دوم و درصد رطوبت با جهت مثبت محور دوم و درصد شن در جهت منفی محور دوم همبستگی نشان می‌دهند (شکل ۳). تجزیه چند متغیره نشان می‌دهد که گونه‌های *St.laxa* *Ph.paniculatum* و *Pe.abrotanoides* در راستای شاخص‌های نیتروژن، پتاسیم، فسفر، آهک، هدایت الکتریکی


براساس نتایج مقایسه میانگین به‌دست آمده در این تحقیق، درصد رس و درصد رطوبت خاک در رویشگاه آتش‌سوزی شده در مقایسه با شاهد به صورت معنی‌دار کاهش یافت به گونه‌ای که تغییر روند میانگین آنها به ترتیب از ۱۷/۹۳ به ۱۰/۵۹ و ۶/۰۹ به ۳/۳۹ در منطقه بوده است. این در حالی است که درصد سیلت، قابلیت هدایت الکتریکی، مواد خنثی شونده (آهک)، کربن آلی، نیتروژن، فسفر قابل جذب، پتاسیم و اسیدیته خاک (pH) در تیمار آتش‌سوزی شده به صورت معنی‌دار بیش‌تر از مناطق شاهد بود.

نتایج تجزیه آنالیز کاهشی (RDA) بین پوشش و خاک

روابط بین عوامل خاکی با گونه‌های گیاهی در تیمار آتش‌سوزی و شاهد نشان داد که اثر عوامل مربوط به خاک شامل رس، درصد رطوبت، درصد مواد آلی، درصد کربن آلی،

بیشتری برقرار نمودند. گونه *Br. tectorum* در جهت مثبت محور دوم و با شاخص رطوبت و گونه *St. laxa* در جهت منفی محور دوم و با شاخص درصد شن همبستگی نشان داد.

و درصد کربن آلی و ماده آلی قرار داشتند. این در حالی است که، گونه‌های *Ach. cornopus sp*، *Ph. herba ventii* و *My. olympica*، *Ono. cornuta* و *milefolium* با عوامل درصد رطوبت و رس همبستگی




شکل ۳- دیاگرام دویبعی روابط گونه‌های گیاهی مرتع با عوامل خاکی Clay: رس، Silt سیلت، Sand: شن، Moisture: درصد رطوبت، EC: هدایت الکتریکی، pH: اسیدیته، Caco3: آهک، oc کربن آلی، om: ماده آلی، N: ازت، K: پتاسیم، P: فسفر، محور افقی محور اول و محور عمودی محور دوم است.

Figure 3. Two-dimensional diagram of the relationship between rangeland plant species and soil factors

اسم کامل گونه	مخفف اسم گونه گیاهی در شکل
<i>Ph.paniculatum</i>	<i>Ph.pa</i>
<i>St.laxa</i>	<i>St.la</i>
<i>Pe.abrotanoides</i>	<i>Pe.ab</i>
<i>Ph. herba ventii</i>	<i>Ph. he</i>
<i>Cornopus sp</i>	<i>Co.sp</i>
<i>Ach. milefolium</i>	<i>Ach. mi</i>
<i>On. cornuta</i>	<i>Ono. co</i>
<i>My. olympica</i>	<i>My. ol</i>
<i>Astragalus sp</i>	<i>As.sp</i>
<i>Br. tectorum</i>	<i>Br. te</i>
<i>St. laxa</i>	<i>St. la</i>

نداشته است. از جمله گونه‌های شاخص منطقه آتش می‌توان *Thaeniatherum. sp*، *Ho.spontaneum* را ذکر کرد که نسبت به آتش‌سوزی پاسخ مثبت داده‌اند. درحالی که گونه‌هایی چون *Zi.clinopodioides*، *Th. pubescens*، *Ph. herba* و *Co.comofa*، *Sa. minor*، *Da.glemerate* و *ventii* در جهت مثبت محور اول و مختص منطقه شاهد بوده‌اند.

نتایج تجزیه آنالیز کاهشی RDA بین پوشش و منطقه
نتایج حاصل از تجزیه RDA نشان داد که آتش‌سوزی بر پوشش گیاهی منطقه اثر معنی‌داری داشته است ($F= ۸/۰۵۷$) و ($p\text{-value}= ۰/۰۰۱$). دیاگرام دویبعی حاصل از روش RDA، نشان داد که گونه‌های شاخصی چون *Al. Br.tectorum*، *Er.thapsus*، *Ma.vulgare* در راستای محور دوم مشترک بین دو منطقه بوده و آتش بر روی آنها اثر



شکل ۴- دیاگرام دوبعدی روابط گونه‌های گیاهی دو منطقه

Figure 4. Two-dimensional diagram of plant species relations between the two regions

اسم کامل گونه	مخفف اسم گونه گیاهی در شکل
<i>Ma.vulgare</i>	<i>Ma.vu</i>
<i>Er.thapsus</i>	<i>Er.th</i>
<i>Br.tectorum</i>	<i>Br.te</i>
<i>Al.linifolium</i>	<i>Al.li</i>
<i>St.laxa</i>	<i>St.la</i>
<i>Astragalus sp</i>	<i>As.sp</i>
<i>Ho.spontaneum</i>	<i>Ho.sp</i>
<i>Thaeniattherum.sp</i>	<i>Th.sp</i>
<i>Thaeniattherum.sp</i>	<i>Th.sp</i>
<i>Th.pubescens</i>	<i>Th.Pu</i>
<i>Zi.clinopodioides</i>	<i>Zi.cl</i>
<i>Da.glemerate</i>	<i>Da.gl</i>
<i>Sa.minor</i>	<i>Sa.Mi</i>
<i>Co.comofa</i>	<i>Co.co</i>
<i>Ph.herba ventii</i>	<i>Ph.He</i>
<i>Ho.vulgare</i>	<i>Ho.vu</i>

نتایج تحقیق حاضر در تضاد است و دلیل آن می‌تواند به مقدار مواد قابل سوخت و شدت آتش‌سوزی و آثار مکانی و تنوع رفتار گراس‌ها در مواجهه با آتش‌سوزی باشد. کریستوفر (۲۶) نیز افزایش گندمیان چندساله را پس از آتش‌سوزی گزارش داد که با نتایج فوق مطابقت نداشت.

نتایج به‌دست آمده از تجزیه غنای و تنوع پوشش گیاهی توسط شاخص‌های تنوع شانون، منهنیک، سیپسون و مارگلف، در دو رویشگاه شاهد و آتش‌سوزی نشان داد، میزان غنا و تنوع گونه‌ای منطقه شاهد نسبت به آتش‌سوزی بیشتر بوده و از نظر آماری در سطح ۱ درصد معنی‌دار بود. علاوه بر این با بررسی شاخص یکنواختی نشان داده شد که میزان یکنواختی در رویشگاه شاهد بیشتر است، ولی اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. بیشتر بودن تنوع و غنای گونه‌ای با یافته‌های السافوری و همکاران (۱۳) تطابق دارد. اوره و همکاران (۳۵) بیان نمودند که آتش‌سوزی در بوته‌زارهای منطقه‌ی خشک در مکزیک منجر به کاهش غنای و تراکم گونه‌ای شد. در بررسی انجام شده در مراتع نیمه‌خشک توسط قربانی و همکاران (۱۵) نتایج نشان داد که اثر آتش‌سوزی بر کل گونه‌های گیاهی معنی‌دار بوده و باعث افزایش شاخص غنا و تنوع گونه‌ای شد، به‌طوری که با وجود تغییر محسوس درصد ترکیب پوشش گیاهی در سال نخست پس از آتش‌سوزی، با گذشت زمان پوشش گیاهی به‌سمت ترکیب

آتش‌سوزی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر خاک بوم‌سامانه‌های مرتعی دارد. از تأثیرات مستقیم آن می‌توان سوزاندن و تجزیه سریع لاشبرگ، افزایش مقدار معدنی قابل دسترس، تغییر شرایط دمایی و رطوبتی خاک را نام برد. در صورتی که تأثیرات غیرمستقیم آتش‌سوزی بستگی به تغییرات در پوشش گیاهی دارد. از جمله این تأثیرات می‌توان به ایجاد حفره‌هایی که در نتیجه وقوع آتش‌سوزی در جنگل و مرتع ایجاد می‌شود و تأثیر آن‌ها بر جوانه‌زنی و رشد گونه‌هایی که در مراحل اولیه رشد نیاز به نور بیشتری دارند، اشاره نمود. نتایج به‌دست آمده از تجزیه فرم رویشی منطقه نشان داد که در رویشگاه آتش‌سوزی که ۷ سال از زمان آن می‌گذرد، درصد پوشش گندمیان چندساله نسبت به منطقه شاهد کاهش معنی‌داری داشت، درحالی که تراکم یکساله‌ها در منطقه آتش‌سوزی نسبتاً با افزایش مواجه بوده است ولی اختلاف معنی‌دار نبود. در تحقیقی مشابه میبه و همکاران (۳۰) کاهش تراکم گندمیان چندساله را پس از آتش‌سوزی گزارش کردند. همچنین این نتایج در یافته‌های مطالعات رینوالد (۳۸)؛ دیویس و همکاران (۱۱) با مطابقت کامل گزارش شده است، اما ریمر و ایوانس (۴۰) و تیزون و همکاران (۴۴) گزارش کردند که گراس‌های چندساله، یک سال بعد از آتش‌سوزی افزایش می‌یابند و در اراضی بدون پوشش در عرصه آتش‌سوزی نیز مستقر می‌شوند، این موضوع از این لحاظ با

اولیه قبل از وقوع آتش‌گرایش پیدا کرده است که یافته‌های آن‌ها مشابهتی با نتایج ما نداشت. پس از آتش‌سوزی تنوع گونه‌ای به دلیل کاهش رقابت گیاهان چندساله و نبودن مکانیسم‌های مؤثر پراکنش و اندام تکثیرکننده بذر کاهش یافت و شش سال پس از آن با مساعد شدن شرایط و افزایش تنوع باعث توزیع یکسان گونه‌ها و افزایش یکنواختی در طی زمان شد.

بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، درصد رس رویشگاه آتش‌سوزی شده در مقایسه با شاهد به صورت معنی‌دار کاهش یافت. این در حالی است که درصد سیلت در رویشگاه آتش‌سوزی شده در مقایسه با شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد. کاهش معنی‌دار درصد رس بر اثر آتش‌سوزی در مطالعه حاضر را می‌توان ناشی از جداسازی انتخابی ذرات رس توسط قطرات باران و وقوع فرسایش پس از سوختن پوشش گیاهی و لخت شدن خاک دانست (۲). گرنجد و همکاران (۱۷) تغییرات تدریجی ویژگی‌های خاک در خاک‌های مدیترانه‌ای در طول ۳ سال پس از آتش‌سوزی را مطالعه کردند. این پژوهشگران گزارش کردند که، آتش موجب درشت شدن بافت خاک پس از آتش‌سوزی شد به طوری که در نتیجه آتش‌سوزی درصد شن افزایش و درصد رس و سیلت به علت فرایندهای فرسایش و جداسازی انتخابی ذرات ریز خاک کاهش یافت. افزون بر آن، علت کاهش رس بر اثر آتش‌سوزی را می‌توان ناشی از دهیدراته شدن رس‌ها در دامی بالا دانست (۲۲).

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که آتش‌سوزی باعث افزایش درصد کربن آلی خاک در تیمارهای آتش‌سوزی شده است. دلیل افزایش کربن آلی پس از وقوع آتش، کاهش میزان معدنی شدن به دلیل کاهش فعالیت‌های بیولوژیکی از طریق کاهش تجزیه مواد هوموسی در اثر سوختن، اتصال کربن آلی با مواد معدنی و حفاظت در مقابل تجزیه بیوشیمیایی همانند ترکیبات کربنی معطر، تغییر شکل مواد آلی به مواد بسیار پایدار نظیر کاهش اکسیژن و کربن آلکیل‌ها و تولید زنجیره‌های کربنی کوتاه، به علاوه تولید مواد آبریز در سطح خاک و تکرار ورود گونه‌های تثبیت کننده ازت در تیمارهای آتش‌سوزی شده بوده است (۳۲). گزارشات متفاوتی از اثرات آتش‌سوزی بر مقدار ماده آلی خاک موجود است، به طوری که برخی از پژوهشگران، افزایش مقدار کربن آلی و برخی دیگر کاهش مقدار کربن آلی خاک را گزارش کرده‌اند (۱۹، ۳۱). آتش‌سوزی به طور مستقیم (از طریق اکسیداسیون ترکیبات قابل دسترس شامل مواد آلی و لاشبرگ‌ها) و غیرمستقیم (از طریق تأثیر بر فعالیت میکروبی) چرخه کربن را در خاک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ البته بسته به شدت آتش‌سوزی، رطوبت خاک، نوع خاک و ماهیت مواد آتش‌سوزی شده، تأثیر آتش‌سوزی بر مقدار کربن آلی خاک متفاوت است (۳). در این پژوهش، مقدار کربن آلی تحت تأثیر آتش‌سوزی افزایش یافت که با نتایج موتیا و همکاران (۳۲) همخوانی دارد.

نتایج این تحقیق نشان داد که درصد رطوبت خاک در تیمار آتش نسبت به شاهد کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به این که توانایی خاک برای جذب آب پس از آتش‌سوزی به طور مستقیم به درجه حرارت خاک و مقدار مواد آلی مصرف شده بستگی دارد، می‌تواند یکی از دلایل کاهش رطوبت در مرتع باشد. ال‌دیابانی (۱۲) بیان می‌دارد که با افزایش حرارت، ظرفیت نگهداری رطوبت کاهش می‌یابد. کاهش رطوبت خاک در رویشگاه آتش‌سوزی شده به دلیل حذف پوشش گیاهی، هوموس و در معرض قرار گرفتن خاک به طور مستقیم در برابر عوامل جوی است که باعث کاهش ظرفیت ذخیره آب در خاک است، که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. شانگ و همکاران (۴۸) گزارش کردند یک‌سال بعد از آتش‌سوزی رطوبت اشباع خاک کاهش یافت اما ۱۱ سال بعد به سطح قبل از آتش‌سوزی بهبود یافت، در حالی که فولتر و همکاران (۱۴) گزارش کردند ۶ ماه بعد از آتش‌سوزی رطوبت اشباع خاک افزایش می‌یابد. جیمزگونسالس و همکاران (۲۵) گزارش کردند ۱ ماه بعد از آتش‌سوزی، رطوبت اشباع خاک افزایش یافت اما ۲۴ ماه بعد از آتش‌سوزی نسبت به تیمارهای شاهد کاهش پیدا کرد.

نتایج تجزیه واریانس، تأثیر معنی‌دار آتش‌سوزی را بر مقدار نیتروژن کل خاک در بین دو منطقه در سطح ۵ درصد نشان داد. تأثیر آتش‌سوزی بر تغییر میزان نیتروژن کل خاک در مطالعات مختلف متفاوت است. برخی از پژوهشگران، افزایش مقدار نیتروژن کل (۴، ۱۶، ۳۲) و برخی دیگر کاهش مقدار نیتروژن کل خاک (۴۵) را تحت تأثیر آتش‌سوزی گزارش کردند. گزارش‌های مختلف درباره تغییر میزان نیتروژن کل خاک در اثر آتش‌سوزی، می‌تواند ناشی از عوامل محیطی مختلف نظیر رطوبت خاک، آبشویی، فرسایش و عمق نمونه‌برداری باشد (۱۹). همچنین شدت و دامی آتش‌سوزی و نوع پوشش گیاهی که در معرض آتش‌سوزی قرار می‌گیرد، می‌تواند از علل مؤثر بر تغییرات نیتروژن کل خاک باشد (۳). احتمالاً شدت و دامی آتش‌سوزی در منطقه مورد مطالعه در این پژوهش پایین بود و متعاقب آن سوختن لاشبرگ‌ها به آرامی صورت گرفته و دامی آتش‌سوزی به حدی نرسیده است که نیتروژن تصعید و وارد اتمسفر شود. به همین دلیل، مقدار نیتروژن کل خاک در خاک با سابقه آتش‌سوزی بیشتر

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قابلیت هدایت الکتریکی در تیمار آتش‌سوزی شده به صورت معنی‌دار بیشتر از رویشگاه شاهد مجاور بود. افزایش قابلیت هدایت الکتریکی در خاک‌های تحت آتش‌سوزی به افزایش مقدار یون‌های معدنی محلول در نتیجه اشتعال مواد آلی خاک است (۴۱). همچنین سوختن پوشش گیاهی و تبدیل آن به خاکستر

هستند. این درحالی است که در تیمار آتش، گونه‌های *ph. Al.linifohum* تحت‌تأثیر فسفر، پتاسیم، نیتروژن، هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی، ماده آلی، آهک همبستگی بیشتری با این تیمار داشتند. این روند شاید به دلیل افزایش مواد معدنی و کاهش رطوبت به‌عنوان عامل محدود کننده، در اثر آتش‌سوزی باشد. علاوه بر این درصد شن و سیلت در تیمار آتش‌سوزی تأثیر کم‌تری بر روی پوشش گیاهی داشت. درحالی‌که در جهت محور شاهد گونه‌های *Ph. herba Ono. Ach. milefolium, Cornopus sp ventii* و *My. olympica cornuta* مشاهده شده که بیشتر با عوامل درصد رطوبت و رس ارتباط داشته‌اند.

تحقیق فوق نشان می‌دهد که آتش‌سوزی بر گونه‌های مختلف، تأثیرات متفاوتی دارد و نمی‌توان یک نسخه واحد در مورد تأثیر آتش بر تغییرات پوشش گونه‌های بوته‌ای و علفی نوشت. پاسخ گونه‌ها به آتش به‌طور قابل توجهی در داخل و بین گونه‌ها متفاوت است و بستگی به پارامتر اندازه‌گیری شده دارد. علاوه بر این، این پاسخ‌ها تحت‌تأثیر انواع پارامترهای آتش‌سوزی از جمله، شدت آتش (به‌عنوان مثال، مقدار مواد آلی مصرف شده)، تکرار، فصل سوختگی و زمان پس از وقوع آتش قرار دارد، که همه این عوامل به‌طور قابل توجهی اثرات متفاوتی از آتش‌سوزی را بر جای می‌گذارند. علاوه بر این، فاکتورهای متعدد فیزیکی و اقلیمی (به‌عنوان مثال، شرایط احواء و آب و هوا) و عوامل بیولوژیکی و مکانیسم‌های که پس از آتش‌سوزی گونه انتخاب می‌کند، بر نتایج بدست آمده مؤثرند. نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات صورت گرفته توسط سایر محققین حاکی از اثرات آتش‌سوزی بر بیشتر خصوصیات شیمیایی خاک بوده و اثرات آن بر روی تغییرات پوشش گیاهی، با توجه به شرایط مختلف منطقه، نوع گونه‌های گیاهی موجود، متفاوت بوده و در بعضی موارد مثبت و یا منفی است بنابراین هم بررسی کوتاه‌مدت و هم بلندمدت اثرات آتش‌سوزی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی برای روشن شدن نقش آتش‌سوزی بر اکوسیستم‌های مرتعی ضروری به‌نظر می‌رسد.

شده است (۲۰). همچنین در مطالعه حاضر نشان داده شد که در اثر آتش‌سوزی، مقدار ماد آلی خاک به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. از طرفی، همبستگی بالایی بین مقدار کل نیتروژن خاک و مقدار ماد آلی خاک وجود داشت. بنابراین، افزایش نیتروژن کل خاک می‌تواند در نتیجه افزایش ماده آلی خاک در اثر آتش‌سوزی باشد (۷).

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان کربنات کلسیم خاک در اثر آتش‌سوزی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. زیرا پس از آتش‌سوزی میزان کاتیون‌های کلسیم، منیزیم، و پتاسیم و آنیون‌های SO_4^- به‌طور قابل ملاحظه‌ای در محلول خاک افزایش یافته است. گرد و همکاران (۱۷) و هوبنسک و همکاران (۲۱) اثر آتش‌سوزی را بر افزایش درصد آهک معنی‌دار می‌دانند که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که میزان فسفر در تیمارهای آتش‌سوزی شده، افزایش معنی‌داری داشته‌است. احتمالاً افزایش مقدار فسفر قابل استفاده در تیمار آتش‌سوزی ناشی از سوختن مواد آلی حاصل از پوشش گیاهی است که سبب افزایش شکل غیر آلی فسفر در خاک شده است. افزایش فسفر خاک در منطقه آتش‌سوزی شده در اثر تجزیه خاکستر و معدنی شدن فسفر آلی در اثر حرارت است (۴). ماتیکس-سولرا و همکاران (۳۱)، نیز در تحقیقات خود، به افزایش فسفر در اثر آتش‌سوزی دست یافتند که با نتایج این پژوهش همخوانی داشت درخصوص پتاسیم خاک نتایج این تحقیق نشان داد که میزان پتاسیم در تیمارهای سوخته، افزایش معنی‌داری داشته است. احتمالاً در اثر سوختن مواد آلی و رها شدن پتاسیم موجود در آن و همچنین آزادسازی پتاسیم از کانی‌های حاوی پتاسیم تحت‌تأثیر حرارت ناشی از سوختن در خاک، سبب افزایش پتاسیم قابل استفاده در خاک شده است. نتایج این تحقیق با تحقیقات، آرف و همکاران (۲)، گومز و همکاران (۱۶)، بادیا و همکاران (۴) مطابق دارد.

نتایج این تحقیق نشان داد که در تیمار آتش مهم‌ترین عوامل حاکی تأثیرگذار بر تغییرات پوشش گیاهی شامل فسفر، پتاسیم، نیتروژن، هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی، ماده آلی، آهک و در تیمار شاهد میزان درصد رطوبت و رس

منابع

1. Alcaniz, M., L. Outeiro, M. Francos and X. Ubeda. 2018. Science of the total environment, (613-614): 944-957.
2. Aref, I.M., H.A. Elatta, M.O. Alghamde and A. Rahmand. 2011. Effect of forest fires on tree diversity and some soil properties. International Journal of Agriculture and Biology, 13(5): 659-664.
3. Ashrafi Saedloo, S.A. and M.H. Sadeghiani. 2016. The effect of Tsh Svzy on soil organic carbon and the availability of nutrients Drjnjl Hay Oak Sardasht. Applied soil research, 2(2): 28-39.
4. Badia, D., C. Marti, A.J. Aguirre, J.M. Aznar, J.A. Gonzalez-Perez, J.M. De la Rosa, J. Leon, P. Ibarra and T. Echeverria. 2014. Wildfire effects on nutrients and carbon of a Rendzic Phaeozem in NE Spain. Changes at cm-scale topsoil. Catena, 113: 267-275.
5. Bohrani, M.J. 2007. Introduction to rangeland and rangeland. Iage Publications, 144 pp (In Persian).
6. Brockway, D.G., R.G. Gatewood and R.B. Paris. 2002. Restoring fire as an ecological process in short grass prairie ecosystems: initial effects of prescribed burning during the dormant and growing seasons. Italian Journal of Environmental Management, 65: 135-152.
7. Busse, M.D. and L.F. DeBano. 2005. In wild land fire in ecosystems: Effects of fire on soil and water. General Technical Report RMRSRGT, 42.

8. Cassie, L., J.E. Hebel and K. Smith. 2009. Invasive plant species and soil microbial response to wildfire burn severity in the Cascade Range of Oregon. *Applied Soil Ecology*, 42: 150-159.
9. Cawson, J.G., P. Nyman, H.G. Smith, P.N.J. Lane and G.J. Sheridan. 2016. How soil temperatures during prescribed burning affect soil water repellency, infiltration and erosion. *Geoderma*, 278: 12-22.
10. Certini, G. 2005. Effects of fire on properties of forest soils: a review. *Oecologia*, 143: 1-10.
11. Davies, K.W., R.L. Sheley and J.D. Bates. 2008. Does fall prescribed burning *Artemisia tridentata* steppe promote invasion or resistance to invasion after a recovery period? *Journal of Arid Environments*, 72: 1073-1082.
12. Eldiabani, G. 2011. Forest fires and their effect on chemical and physical properties of soil in north-eastern, Libya, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of Bradford, division of archaeological, Geographical and Environmental Sciences, 228 pp
13. Elsafori, K., A.N. Guma and M.A. El Nour. 2011. Soil seed banks of a rangeland area White Nile State. *Sudan Journal of Horticulture and Forestry*, 3(6): 185-178.
14. Fultz, L.M., J. Moore-Kucera, J. Dathe, M. Davinich, G. Perry, D. Wester, D.W. Schwilk and S. Rideout-Hanzak. 2016. Forest wildfire and grassland prescribed fire effects on soil biogeochemical processes and microbial communities: Two case studies in the semi-arid Southwest. *Applied Soil Ecology*, 99: 118-128.
15. Ghorbani, J., A.R. Mansori, N. Safaeian and R. Tamartash. 2011. The path of vegetation changes after fires in semi-arid pastures. The first international conference on firefighting in Gorgan's natural resources, 4-6 November (In Persian).
16. Gomez-Rey, M.X., A. Couto-Vazquez, S. Garcia-Marco and S.J. Gonzalez-Prito. 2013. Impact of fire and post-fire management techniques on soil chemical properties. *Geoderma*, 1(195): 155-164.
17. Granged, A.J.P., L.M. Zavala, J. Antonio and G. Bárcenas-Moreno. 2011. Post-fire evolution of soil properties and vegetation cover in a Mediterranean heathland after experimental burning: A 3-year study. *Journal of Geoderma*, 164: 85-94.
18. Garcia, N. 1977. The effects of fire on the vegetation of Donana national park, *Journal of Spain. Technical, Report*, 3(1): 318-325.
19. Hamman, S.T., I.C. Burke and E.E. Knapp. 2008. Soil nutrients and microbial activity after early and late season prescribed burns in a Sierra Nevada mixed conifer forest. *Forest Ecology and Management*, 256: 367-374.
20. Hatten, J., D. Zabowski, G. Scherer and E. Dolan. 2005. A comparison of soil properties after contemporary wildfire and fire suppression. *Forest Ecology and Management*, 220: 227-241.
21. Haubensak, K., C.D. Antonio and D. Wixon. 2009. Effect of fire and environmental variables and composition in grazed salt desert shrub lands of the Great Basin (USA). *Journal of Arid Environments*, 73: 643-650.
22. Hubbert, K.R., H.K. Preisler, P.M. Wohlgenuth, R.G. Graham and M.G. Narog. 2006. Prescribed burning effects on soil physical properties and water repellency in a steep chaparral watershed, Southern California, USA. *Geoderma*, 130: 284-298.
23. Iglesias, M.T. 2010. Effects of fire frequency on nutrient levels in soils of Aleppo pine forests in southern France. *Lazaroa*, 31: 147.
24. Jafari haghghi, M. 2004. Methods of soil analysis (Sampling and important analysis of physical and chemical). Press of Neda of Zoha, 236 p (In Persian).
25. Jiménez-González, M.A., J.M. De la Rosa, N.T. Jiménez-Morillo, G. Almendros, J.A. González-Pérez and H. Knicker. 2016. Post-fire recovery of soil organic matter in a Cambisol from typical Mediterranean forest in Southwestern Spain. *Science of the Total Environment*, 572: 1414-1421.
26. Kristofor, R.B. 2006. Soil physiochemical changes following 12 years of annual burning in humid-subtropical tall grass prairie: a hypothesis. *Acta Ecologica*, 30: 407-413.
27. Karimzadeh, A., Z. Jafarian, J. Ghorbani and M. Akbari. 2012. Analysis of the Relationship between Species Diversity and Environmental Factors using Multivariate Analysis (Case Study: Sorkhdeh Rangelands of Semnan, Iran), *Journal of Range and Watershed Management, Iranian Journal of Natural Resources*, 65(1): 131-143 (In Persian).
28. Lombao, A., A. Barreiro, T. Carballas, M.T. Fontúrbel, A. Martín, J. Vega and M. Díaz-Raviña. 2014. Changes in soil properties after a wildfire in Fragas do Eume Natural Park (Galicia, NW Spain). *Catena*, 135: 409-418.
29. Lucas-Borja, M.E., J. González-Romero, P.A. Plaza-Álvarez, J. Sagra, M.E. Gómez, D. Moya and J. Heras. 2019. The impact of straw mulching and salvage logging on post-fire runoff and soil erosion generation under Mediterranean climate conditions. *Science of the Total Environment*, 654: 441-451.
30. Mapiye, C., M. Mwale, N. Chikumba and M. Chimonys. 2008. Fire as a Rangeland management tool in the sarannas of southern Africa, *Tropical and sub-tropical Agroeco systems*, 8: 116-124.
31. Mataix-Solera, J., A. Cerda, V. Arcenegui, A. Jordan and L.M. Zavala. 2011. Fire effects on soil aggregation: A review. *Earth-Science Reviews*, 109: 44-60.
32. Montoya, S., G. Marín and E. Ortega. 2014. Impact of prescribed burning on soil properties in a Mediterranean area (Granada, SW Spain). *Spanish Journal of Soil Science*, 1(4): 88-98.

33. Morgan, J.W. and I.D. Lunt. 1999. Effects of time-since-fire on the tussock dynamics of dominant grass in a temperate Australian grassland. *Biological Conservation*, 88: 379-386.
34. Neary, D.G., C.C. Klopatek, L.F. DeBano and P.F. Ffolliott. 1999. Fire effects on belowground sustainability: a review and synthesis. *Forest Ecology and Management*, 84:28-98.
35. Orea, Y.M., S.C. Arguero, P.G. Chavez and I. Sanchez. 2010. Post-Fire Seed Bank in a xerophytic scrubland. *Bol. Soc. Bot. Méx*, 86: 11-21.
36. Paz-Ferreiro, J. and S. Fu. 2013. Biological indices for soil quality evaluation: perspectives and limitations. *Land Degradation and Development*, 27: 14-25.
37. Raigani, B., Gh.R. Zahtabian, H. Azarnivand, S.K. Alavipanah and S.J. Khagedin. 2015. Evaluating the performance of Lada method in investigating the soil degradation status of East Isfahan region. *Natural Resource of Iran*, 68(1): 109-129 (In Persian).
38. Reinwald, A.D. 2013. Effects of disturbing restoration treatments on native grass revegetation and soil seed bank composition in chaetgrass-invaded sagebrush-steppe ecosystems. All Graduate Theses and Dissertations.
39. Report of the General Department of Natural Resources of Mazandaran Province. 2016 (In Persian).
40. Rimer, R.L. and R.D. Evans. 2006. Invasion of downy brome (*Bromus tectorum* L.) causes rapid changes in the nitrogen cycle. *American Midland Naturalist*, 156: 252-258.
41. Sanroque, P., J.L. Rubio, J. Mansanet. 1987. Effects de los incendios forestales en las propiedades del suelo, en la composición florística y en la erosión hídrica de zonas forestales. *Revue de Ecologie et Biologie du Sol*, 22: 131-147.
42. Santin, C. and S.H. Doerr. 2016. Fire effects on soils: the human dimension. *Phyl. Trans. R. Soc. B*, 371(1696): 20150171.
43. Ter Braak, C.J.F. and P. Smilauer. 2002. CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Ithaca, NY: Microcomputer Power, 500 pp.
44. Tizon, F.R., D.V. Pelaez and O.R. Elia. 2010. The influence of controlled fires on a plant community in the south of the Caldenal, and its relationship with a regional state and transition model. *Phyton-Revista Internacional de Botanica Experimental*, 1: 79-141.
45. Turner, M.G., E.A.H. Smithwick, K.L. Metzger, D.B. Tinker and W.H. Romme. 2007. Inorganic nitrogen availability after severe stand-replacing fire in the Greater Yellowstone ecosystem. *Proceedings on the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104: 4782-4789.
46. Ulery, A.L., R.C. Graham, B.R. Goforth and K.R. Hubbert. 2017. Fire effects on cation exchange capacity of California forest and woodland soils. *Geoderma*, 286: 125-130.
47. Verma, S. and S. Jayakumar. 2012. Impact of forest fire on physical, chemical and biological properties of soil: A review. *Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences*, 4(2): 811-891.
48. Xiang, X., Y. Shi, J. Yang, J. Kong, X. Lin, H. Zhang, J. Zeng and H. Chu. 2014. Rapid recovery of soil bacterial communities after wildfire in a Chinese boreal forest. *Scientific Reports*, 4: 3829.

The Effect of Fire on Vegetation and Some Physical and Chemical Properties of Soil (Case study: Varcheshmeh Tusmal Rangeland, Mazandaran)

Soudabeh Yadollahnejad¹, Zeinab Jafarian², Ghodartollah Haeidari³ and Reza Tamartash⁴

-
- 1- Graduated M.Sc. Student, in Rangeland Sciences, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2- Professor, of Rangeland Sciences Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (Corresponding author: z.jafarian@sanru.ac.ir)
3- Associate Professor, of Rangeland Sciences Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
4- Associate Professor, of Rangeland Sciences Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

Received: 13 June, 2020

Accepted: 14 October, 2020

Abstract

Fire is one of the most important ecological factors that can change the function of natural ecosystems. Plant growth depends on the soil, and fire can cause various changes in it. In order to investigate the effect of fire on soil and vegetation, two sites were selected including control and firefighting, each of them with an area of 37 ha, in Varcheshmeh Tusmal Rangeland of Kiasar in Mazandaran province. And in each site was done sampling of vegetation and soil by random – systematic sampling. In each site, 10 drilling and sampling profiles were performed from a depth of 0-15 and 0-30 cm. 30 square plots (1m²) were used to collect vegetation data. Plant characteristics including life form, biodiversity and soil characteristics including moisture, texture, electrical conductivity, acidity carbon, organic matter, lime, nitrogen, phosphorus, potassium were determined. The results of life forms in control and burnt rangelands showed that due to the fire of perennial species, the burned areas decreased by 33.15% compared to control. While it did not have a significant effect on annual and biennial species. The results of the effect of fire on the diversity of the whole species showed that the characteristics of the number of species, Simpson, Shannon, Margalf and Mannhinik richness were decreased 66.66, 45.6, 57.92, 67.74 and 129.49% respectively. While fire had no significant effect on the uniformity index. The results of soil experiments showed that the percentage of sand and silt, soil absorbable potassium, adsorbent phosphorus, soil nitrogen, lime, carbon, organic matter, soil acidity and electrical conductivity in burned treatment increased significantly. However, the percentage of clay and the percentage of soil moisture in the burned areas compared to the control showed a decreasing trend.

Keywords: Fire, Redundancy analysis, Species variety, Rangeland